

Masticlox® MC (Intramammary Infusion)

مستی کلوکس® ام سی (پماد داخل پستانی)

دسته دارویی

آنتی بیوتیک

شکل دارویی

پماد استریل داخل پستانی

ترکیب

هر سرنگ ۵ گرمی حاوی:

۷۵ میلی گرم	آمپی سیلین سدیم
۲۰۰ میلی گرم	کلوگزاسیلین سدیم
۵ گرم	پایه روغنی تا

حیوان هدف

گاو

اطلاعات دارویی

مستی کلوکس ام سی یک فرآورده دارویی دامی است که به شکل سوسپانسیون پماد داخل پستانی جهت پیشگیری از عفونت های میکروبی در دوره شیرواری دام بکار می رود.

مواد موثره موجود در مستی کلوکس ام سی شامل آنتی بیوتیک های بتا لاکتام (پنی سیلین ها) بر روی طیف وسیعی از میکروب های گرم مثبت و گرم منفی موثر می باشد.

آمپی سیلین و کلوگزاسیلین یک آنتی بیوتیک نیمه سنتتیک از گروه بتالاکتام هاست که بر روی استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه و سایر گونه های استرپتوکوک، گونه های استافیلوکوک، کورینه باکتریوم پایوژنزو اشرشیا کلای و سایر باکتری های عفونت زای عامل ورم پستان دام موثر می باشد.

موارد مصرف

در درمان عفونت ها و تورم پستانی ناشی از میکروارگانیزم های حساس به مواد موثره این دارو در دوره شیرواری تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف

به هنگام مشاهده علائم ورم پستان، کارتیه مبتلا را توسط پنبه الکلی یا محلول های ضد عفونی کننده مناسب، تمیز و ضد عفونی کرده و محتوی هر سرنگ را بعد از خارج نمودن درپوش آن داخل یک کارتیه به آرامی تزریق نمایید. در صورت لزوم تزریق پس از ۱۲ ساعت تکرار شود. این محصول می تواند حداکثر تا سه نوبت استفاده شود. جهت جذب بهتر و اثربخشی دارو پس از تزریق، کارتیه را از پایین به بالا ماساژ دهید.

موارد احتیاط

- از دیاد حساسیت به پنی سیلین و سایر داروهای گروه بتالاکتام باید مورد توجه قرار گیرد.
- در دوره خشکی استفاده نشود.

زمان منع مصرف

از مصرف شیر تا ۳ روز و از مصرف گوشت تا ۷ روز پس از آخرین دوز درمانی خودداری نمایید.

شرایط نگهداری

در جای خشک، خنک (دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد) و دور از نور نگهداری شود. از یخ زدگی محصول محافظت شود.

بسته‌بندی

۲۴ عدد سرنگ پلی اتیلنی ۱۲ میلی لیتری محتوی ۵ گرم پماد آماده مصرف در هر جعبه